



2020.03.03

Huvudlöss

Lusen är 2–3 mm lång, smutsgul och nästan genomskinlig. En lus lever ungefär en månad. Äggen, så kallade gnetter, är hudfärgade och kan vara svåra att upptäcka. Gnetterna sitter fastklibbade på hårstråna, nära hårbotten. Efter 1-2 veckor kläcks de till nya löss.

Vid stark klåda i hårbotten eller rivmärken i nacken bör huvudlöss misstänkas.

Smittvägar/smittspridning

Huvudlöss smittar genom närkontakt, huvud mot huvud under 1 minut eller längre. Risken att smittas via föremål som mössor, kammar och borstar är liten. Löss kan inte flyga eller hoppa. En lus utanför hårbotten lever högst 1-2 dygn.

Inkubationstid

Inkubationstiden kan vara lång från smittillfället till dess att tillräckligt många löss och gnetter finns så att de upptäcks.

Behandling

Bara den som har huvudlöss ska behandlas. Huvudlöss behandlas med receptfria preparat, som finns att köpa på apotek. Lössen hittas säkrast genom att kamma igenom håret med en finkam. Undersök hela familjen. Efter behandling ska håret finkammas efter en och två veckor.

Löss i textilier dör: • Vid maskintvätt i minst 60 grader • I torkskåp 50 grader i 30 minuter • I kyla vid -10 grader under 24 timmar

Ska barnet stanna hemma?

Om behandling och uppföljning skett finns ingen anledning att vara hemma. Observera att tidig rapport till dagbarnvårdaren om ett barn har fått löss gör att åtgärder snabbt kan sättas in. Därigenom kan smittspridning minskas och eventuella utbrott förhindras.